

Q. F. F. F. Q. S.

QUÆSTIONES MEDICÆ DUODECIM,

AB ILLUSTRISSIMIS VIRIS

R. D. JOANNE-FRANCISCO IMBERT,
Universitatis Cancellario amplissimo & Judice,
HENRICO HAGUENOT, Decano admodum
Venerando, ANTONIO FIZES, FRANCISCO
DESAUVAGES, FRANCISCO DE LAMURE,
GABRIELE-FRANCISCO VENEL, CAROLO
LEROI, Regis Confiliariis & Medicis, Professori-
bus Regiis meritissimis

PROPOSITÆ

In Aulâ Episcopali Monspeliensi, coram Illustrissimo ac
Reverendissimo D. D. FRANCISCO-REGINALDO
DE VILLENEUFVE, Monspeliensium Episcopo,
Comite Melgorii & Montisferrandi, Marchione Marquerosæ,
Barone Salvii, &c. & Regi à Confiliis Secretioribus

Pro Regiâ Cathedrâ vacante

Per promotionem R. D. JOANNIS-FRANCISCI IMBERT, Professoris
Regii clarissimi ad Cancellariatum dictæ Universitatis

*Quas Deo favente, & auspice Dei-parâ, propugnabit in Almâ Monspeliensi
Medicina Universitate, triduo integro manè & serò, diebus scilicet 21.
22. & 23. mensis Augusti anni 1760.*

FRANCISCUS VIGAROUS, M. D. M.



MONSPELII,

Apud Viduam JOANNIS MARTEL, Regis & Universitatis Medicinæ
Typographi. 1760.

DEO
UNI ET TRINO,
AC
BEATÆ VIRGINI
DEI-PARÆ,

D. D. D. C.

FRANCISCUS VIGAROUS, M. D. M.



QUÆSTIO PRIMA.

An theoriæ, an verò praxi medicæ utiliores sint notiones anatomicae?



UDIOREM & superficiariam corporis humani anatomem, solâ cadaverum inspectione acquirendam, quæ partium figuram, situm, magnitudinem, nexum nos doceat, tum theoriæ, tum praxi medicæ utilem esse imò & necessariam, nemo est qui ambigat. Ast cuinam ex his Medicinæ partibus utilior sit, subtilis solers hæc ars sub hoc felici sæculo adeò exulta, quæ

organorum, viscerum, partium quarumcumque intimam structuram, sive in animalibus, sive in homine evolvit; singularem illorum fabricam, vasorum ordines, dispositiones, reptatum attentis oculis perlustrat; microscopiis, lenticularibus vitris, injectionibus, variisque utitur mediis quæ felix sibi comparavit Anatomicorum industria. Circà subtiliorem hanc anatomen moveri quæstionem credimus, quam fausto adeò cum successu promovebant olim Illustrissimi *Malpighius*, *Ruyschius*, *Monroo*, aliique, & nostris temporibus adeò illustrent *Winslowius*, *Morgagnius*, *Senacius*, *Ferreinnius*, *Bertinus*, &c. De hac igitur à nobis quæritur an theoriæ, an praxi medicæ utilior sit?

Anatomicorum laboribus & inventis natales debere Medicinæ theoriam author est *Celsus* (a) qui *Erasistratum* & *Herophilum* ex methodicâ sectâ ferè Principes, non solum cadavera secare, sed & vivorum corpora cultro incidere refert, ut ea quæ natura antè clausisset, etiamnum spiritu remanente considerarent. Ex his autem temporibus pari passu & Medicinæ theoria, & anatomes illustratæ, amplificatæ sunt. Etsi fortè quid in œconomix ani-

malis motibus clariùs perspicimus, id indefessis Anatomicorum laboribus, & feraci industriæ debemus.

Quid dicam de circulatione harvæanâ, quæ veræ theoriæ adeò profuit! Quid de anatome comparativâ quâ noverat *Malpighius* structuram humanorum viscerum ex analogiâ assequi; quam felici cum successu excoluere parisienses Academici (a); quâ digestionis negotium elucidare potuit clariss. *Realmurius*, dùm diversam esse hujusce functionis rationem pro variâ ventriculi structurâ observabat; in animalibus experimenta instituebat hujusce Lycæi Professor illustriss. dùm respirationis & cerebri motuum consensum invictè comprobavit! Quid de rarissimâ *Ruifschii* arte replendi injectionibus vasa & quidem minima, singularem vasorum apparatus demonstrandi! Quid de indefessâ *Vieussensii* nostri industriâ in extricandis nervorum ambagibus! Quis *Winslowii*, *Albini*, *Douglasii* solertiam fatis unquàm laudabit? Cùm igitur, ut cum *Schreibero* loquar, philosophari de corpore humano teneatur Medicus theoreticus & perspectas habere tum sanitatis, tum morborum corporis humani causas. Quomodo phænomenum sub hoc duplici statu observabilium rationem reddere poterit quorum causæ altâ caligine latent? hæc solus præstabit Anatomicus qui lynceis, ut ita dicam, oculis, partium corporis intimam & subtiliorem, quantum homini licet, fabricam noverit. Quis enim respirationis mechanismum describere potuit, nisi qui costarum articulos, diaphragmatis situm, nexum, & ex his pendentia phænomena apprimè noverant illustriss. *Winslowius* (b), *Senacius* (c)? Quis vocis organum & ex hoc novam illius theoriâ condere poterat nisi qui ita laryngis structuram perfectè oculis anatomicis perlustrare potuit, experimenta instituere solertissimus in his *Ferreinius*? Cui digestionis prima organa, horum varios motus quæ tantam in masticationis opere lucem affuderunt ita graphicè exprimere datum est. Solus deniquè potuit *Albinus* deglutitionis causas, phænomena explorare qui organorum deglutitoriorum situs, nexum, linguæ excavatæ fornici palati apice suo applicatæ, retroactæ motus, veli palatini deorsum tracti elevationem, glottidis superioris per epiglottidem obturationem, rimulæ illius, aritænoideorum ope, coarctationem, pharingis & æsophagi varios motus, aliaque exactiùs quidem delineavit. Quid plura proferam? Theoriæ priora fundamenta jecit anatomès; hanc novis quotidie inventis, illustrat, promover.

Praxi medicæ minùs certè utilis videtur subtilior hæc variarum corporis partium disquisitio. 1°. Quod etsi veram illarum fabricam oculis subjiceret, parùm fortè emolumenti praxi medicæ emergeret. Quid

(a) Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle des Animaux.

(b) Exposition anatomique.

(c) Mém. de l'Acad. R. des Sc. an. 1729.

enim in inflammatione jecoris, Clinicis de morbi diagnosi sollicitis interest, an glandulosum sit hepar, an verò vasculorum minutissimorum penicillis conflatum? Quid certi protulit adhuc anatomia circa causas variorum phœnomenum quibus stipantur vulnera aliique capitis affectus? 2°. Morbi causas proximas mutare potuit, Anatomicis inventis illustrata, theoria; alias phœnomenum rationes inquirere; morborum signa diagnostica, prognostica, therapειæ præcepta generalia intacta semper remanebunt. 3°. Solâ observatione & experienciâ edocti, morbos inflammatorios, varias febrium species, cæterosque morbos dignoscere, sanare noverant veteres. Ità signorum doctrinâ, morborum tempora, mutationes, solutiones, subtiliori anatomix prorsus extranea, solâ observatione faciem præ se ferente, prædicabant; ut & praxis nostræ vera sit cynosura antiquorum sagacitas.

Nec tamen ex hoc quis concludat praxi clinicæ inutilem prorsus esse anatomes scientiam; *ista enim natura rerum contemplatio*, ut cum *Celso* loquar, *quamvis non faciat Medicum, aptiorem tamen Medicina reddit*. Quot enim in morbis observantur anomalix, insolita symptomata, quorum causæ omnem Clinicorum doctrinam deludunt, Anatomicorum perspicaciam vix unquàm effugiant; partium putà interiorum organica vitia. Et in externis morbis curandis quem unquàm inveniet parem Clinicus Anatomicus. *Winslowum* Anatomicorum ferè Principem, fama fert, hâc quâ pollebat sagacitate, solo tactu judice, aut repetitâ contrectatione, partium interiorum labem potuisse detegere.

Nec me latet quantum boni praxi medicæ præstaret cadaverum sectio, à Clinicis instituta nulli theoriæ addictis, à præjudicatâ opinione liberis, solo observandi & naturam investigandi desiderio; sed quàm facilè sub hâc operatione se subripit error, dùm ea quæ mortem intulit labe, morbi causa habetur! Sic, v. g. sectis cadaveribus maculas gangrænodeas viscera quandoquè infestare notum est. Quis autem ex hoc concludat gangrænam morbi causam fuisse? Non mirum igitur si ex millenis casibus quæ multo molimine in Medicinæ monumentis cumulavit observatorum chorus, pauci quidem sint, nemine refragante, qui hanc diligentiam sapiant qualem verum artis clinicæ cultorem decet. Ex his intelligitur quo sensu,

Theoria utiliores innuamus notiones anatomicas, minùs verò praxi medicæ utiles.

QUÆSTIO SECUNDA.

Quid sentiendum sit de opinionibus Malpighianâ & Ruischianâ, circa structuram viscerum, & cui ex illis percelebribus Anatomicis palma debetur?

CELEBRIS est inter Anatomicos malpighiana & ruischiana controversia, circa structuram viscerum. Prò utrâque observationibus, experimentis militant Anatomici oculatissimi. Adhuc tamen sub iudice lis est. Quid autem de hâc sentiendum sit, ex dicendis fortè innotescet.

Viscera glandulosa credidit antiquitas conflari vasis innumeris, quæ singula ordinaret, firmaret proprium cuique visceri parenchyma. *Malpighius* primus videtur, qui ex professo, oculis anatomicis, in intimos viscerum anfractus penetraverit. Ex his autem quæ circa viscerum structuram protulit in suis exercitationibus anatomicis, hæc colligere licet. 1°. Summum huncce virum agnoscere viscera glandulosa; hepar, v. g. renes, cerebrum, glandulosum præ se ferre apparatus. De hepate enim hæc habet (a). Hoc autem innumeris ferè glandulis, velut tot uva acinis, integrari habui, quibus sanguinea vasa, vena scilicet porta, & cava extremi fines, arteria, & porus biliaris tanquam proprium excretorium vas appendantur, in gratiam separationis bilis.

Ruischius econtrà, glandulosa corpora è viscerum structurâ expungens, hæc conflata exhibet innumeris vasculorum glomeribus qui in singulis organis diversum obtinent apparatus; in hepate penicillorum instar colliguntur in fasciculos (b); in renibus mirè contorta observantur (c); in cerebro pulpam tomentosam (d) repræsentant; in testibus sub glomeris specie circumvoluta cernuntur; ex vasculorum ultimis ramulis secretorii nascuntur tubuli qui tandè, absque intermedio folliculo, humores ad varia loca devehunt.

Malpighianæ favet sententiæ anatomes comparativa. In cochleis observabat *Malpighius* (e) hepar in plures eosque conicos divisum lobulos, qui ipsi microscopii ope in acinos, proprio distinctos termino, apparebant. In lacertis, piscibus, eandem observabat fabricam. In sciurò,

(a) Oper. posth. De viscerum struct.

(b) Thes. anat. i. n. 7.

(c) Thes. x. n. 86.

(d) Thes. anat. x. n. 31.

(e) Tract. de hepate.

mure montano , tigridè , leænâ aliisque , evidens est glandulosa fabrica ex parisiensium Academicorum observationibus (*a*) ; & tandem de hepate humano loquens (*b*) , diluto sanguine immissâ aquâ , jecoris omnem substantiam lobulis contextam conspicias , qui & ipsi acinis conflantur ; hæc autem confirmat celeberr. vir *Harvæi* observatione , (*c*) qui jecoris parenchyma vasis umbilicalibus accrescere vidit , ut uvæ racemo. Prò *Malpighio* pariter militat celebris *Littrii* observatio (*d*) qui in hepate humano aliundè sano , glandulosos folliculos ità evidenter observabat , ut absquè microscopio , arteriarum extrema , venarum portæ & cavæ ramusculi truncis suis appensi , & porus biliarique ductus in conspectum venirent.

Hanc fabricam testantur glandularum morbi. Hepar in vesiculas , tubercula , hydatides conversum sæpiùs reperire est. *Saltzmanum* , *Forestum* , *Glissonium* , *Panarolium* , aliosque post *Malpighium* (*e*) recenset *Boerhavius* (*f*) similem in hepate degenerationem testantes. *Valsalva* observationes refert *Morgagn.* (*g*) quibus constat , repertas haud semel fuisse vesiculas membraneas , vel totum jecur vel ejus partem efficientes , cum evidenti aliquo inter venæ cavæ ramusculos harumque vesicularum cavæ commercio , nec sine contento humore bilis simillimo. Huc facit *Nannii* observatio. [*V. inf.*] Hepar in hydatides conversum in cadavere hidropici , alibi in vesiculas , limosâ vel glandulosâ materie turgidas exhibet *Ruisch.* (*h*). Et quidem observant quotidie qui cadaverum sectionibus manum admovent , hepar sæpiùs oppleri tuberculis nunc gypseâ quasi & lapideâ , nunc mucosâ aut simili materie turgentibus. De aliis visceribus eadem observant quotidie Practici. Cerebrum in hydrocephalico distinctissimas exhibere glandulas , autor est *Mangetus*. Renem observabat *Littrius* [*Ibid.*] in tubercula variæ magnitudinis elevatum , quæ cellulas membranosas æmulabantur. Plura videre est apud *Malpighium* , *Boerhavius* , ipsumque *Ruisch.* locis citatis.

Fictitiam esse glandularum in visceribus præsentiam asserit *Ruischius* (*h*) : injectionibus enim illam noverat methodum implendi vasa , repleta à mutuo nexu solvendi , sic parata in proprio liquore fervandi ; ut hoc solo argumento rem totam conficere velit , *veni , & vide* , intimam viscerum fabricam oculis ipsis subjiciens. 1°. Enim corticem cerebri

(*a*) Mém. pour servir à l'Histoire naturelle des Animaux.

(*b*) Tract. de hepate , cap. 11.

(*c*) Exercit. XIX.

(*d*) Mém. de l'Acad. 1701.

(*e*) Tract. de hepate.

(*f*) Epist. ad *Ruisch.*

(*g*) Epist. anat. 3.

(*h*) Epistola ad *Boerha.* & passim in suis operibus.

exhibet (a), ejus vascula tomentosa lanugine subtiliora in liquore dissoluta & suspensa, absque ullo certè glanduloso apparatu. 2°. Hepatis frustula (b), mirabili suâ arte repleta servat, quæ vasculorum fasciculos exhibent quibus continui sunt pori bilarii, absque ullâ intermedii folliculi, utriculi, aut acini cavi suspicione. 3°. Variis in locis (c) renes humanos ostendit, in quibus corpuscula quæ prò veris glandulis vulgò habentur, nihil esse aliud quàm vasculorum extrema, mirificè inter se contorta & circumvoluta, quæ cùm exactissimè repleantur arteriæ renales, dissolvuntur, vel expanduntur ut fili glomer. In epistolâ autem ad *Boerhaviûm*, *Malpighii* argumenta evertere satagit; statuens ex anatome comparativâ, nihil concludi in corporis humani fabricæ gratiam; glandularum morbos, nativam illarum mutare fabricam; Vasorum extrema obstructa, liquore immeabili infarcta, & ipsa in tubercula, hydatides, tumores posse elevari, quæ & exemplis plurimis confirmat.

Quid autem de his opinionibus sentiendum est? cui palma debetur? Circâ corticis cerebri structuram dubiùs hæret *Bohlius* (d), qui *Ruifchii* arte præparata viscera, attentis oculis, perlustraverat; *Malpighii* tamen partes amplectitur, in quo consentientem habet *Winflowum* (e) qui folliculos extremis vasculorum cerebri appensos agnoscit, infidam injectionis methodum rejiciens.

Hepatis glandulosam fabricam suadent anatomes comparativa, *Littrii*, *Valsalvæ* & maximè *Nannii* observatio (f), qui mulieris hepar describit in lobos scissum, tubereulis vesicularibus compositos diversæ magnitudinis, in quibus biliosus humor nunc tenuior, nunc tenacior, prò utriculi magnitudine continebatur. Eadem censent celeb. *Morgagni* (g), *Winflow*, (h) *Fantonus* (i). Renibus & vasculosum, & glandulosum apparatus concedunt *Boerhavius*, *Bertinus* (k). In liene malpighianam fabricam post plura experimenta restituit clariss. *Lasone* (l). Vasculosam testiculis tribuunt cum *Graaffio* (m), *Winflow*. (n), *Ferrein*. (o), aliique.

(a) Epist. XII. & Thesaur. anatom. passim.

(b) Id. passim atq. maximè thes. IX. n. LIX.

(c) Pluribus in locis sed expressiùs thes. III. n. XLI. & thes. X. II. 84. 86.

(d) Dissert. Epist. ad Ruisc.

(e) Traité de la tête, à n. 185. ad 90.

(f) Comment. acad. Bonon. I.

(g) Epist. anatom. III.

(h) Traité du bas-ventre, n. 272 & 276. & à 285 ad 288.

(i) Dissert. anatom. de hepate.

(k) Mém. de l'Acad. 1744.

(l) Mém. de l'Acad. 1754.

(m) De vir. organ.

(n) Traité du bas-ventre, n. 487.

(o) Mém. de l'Acad. 1749.

His observationibus & authoritatibus suffulti, dicimus magis probabilem nobis videri malpighianam sententiam. Hanc tamen amplecti vetant, nova *Ferreinii* circa viscerum structuram detecta. Hic enim peritissimus vir corticalem renum substantiam & hepar conflare asserit, substantiâ quadam alba, tenui, tubulis intrâ parenchima contortis & circumvolutis compaginatâ absque ullo ordine, nivis aut gossipii flocculis satis simili, intrâ quàm evanescunt arteriarum ramusculi, secretionis vascula. Huic autem sententiæ, quam fortè ex Hippocrate mutuata credimus, adstipulamur saltem quoad hepatis & renum structuram. Ex his omnibus facile intelligitur

Quid sentiendum sit de opinionibus malpighiana & vuischiana circa structuram viscerum, & cui ex illis percelebribus Anatomicis palma debeatur.



QUESTIO TERTIA.

EXPLICARE modum quo terminari solent tumores tum à solidis tum à fluidis; asserre eorum terminationis signa diagnostica, prognostica, simulque auxilia quibus illis occurrendum est, pro vario modo quo terminantur.

QUÆCUMQUE corporis partis contra naturam elevatio, TUMOR Medico-Chirurgis dicitur.

Tumores autem à solidis fiunt, vel à fluidis. Ad priorem classem reducimus (juxtâ Prof. Illustriss. mentem) luxationes & hernias; in posteriorum censum annumerandi veniunt tumores, vulgò dicti humorales, qui sanguinei sunt vel calidi, ut phlegmone, erisipelas aliique hujusmodi; vel lymphatici seu serosi, ut schirrus, œdema, hisque pertinentia. Tumorum naturam, causas, signa silentio premam; (a) varios tantum terminationis modos, signa, auxilia describere jubet Prof. Illustr. Ut autem singulis faciam satis sit.

10. LUXATIO fieri dicitur, quoties ossa quæ naturaliter juncta sunt, à contigui nexu solvuntur. Factâ luxatione, tumor ad articuli latera enascitur, solâ ossis in situ naturali repositione sanandus. Hæc autem præcipua post se trahit mala; 10. Inflammatio, cum dolore à musculis vel nervis distractis, vexatis, collisis, quæ sæpius, invitis auxiliis, in suppuratum abit. 20. Membri accurtatio, aut elongatio cum difformitate; Cal-
lus, seu ossis luxati cum vicinis accretio. 30. Partis immobilitas stupor,

(a) De his vid, egr. tract. de tum, D.D. Cancell. Ampliss.

quandoquē deliria, convulsiones; imò & paralyfis, si nîmîum compri-
mantur nervi huic famulantes; vel marasmus, aut gangræna, si com-
pressis arteriis penitus denegetur sanguini aditus.

Sanatur primum venæ sectionibus, topicis emollientibus, anodinis, &
tandem ossis repositione, (modò nihil obstat). Secundum solâ partis
repositione curabis; medelam autem rarissimè accipit tumor qui ab osse
luxato, vicinis firmius accreto, fit; non intentata tamen prætermiseris
varia emollientia, quæ in hoc casu commendantur. Tertium citam ex-
postulat Medicinam; hînc illicò tentanda, omni artis molimine, ossis
luxati repositio. Si immineat gangræna, antisepticis avertenda est (de
his inferius). Tandem si nec Chirurgi industriæ, nec medicaminum
efficaciæ cedat, unicum in membri amputatione habes præsidium.

2º. Partis cujuscumque mollis à situ suo dimotæ tumor, *HERNIAM*
vocat celeberrimus *Ledran*. Loca abdominalia maximè occupant herniæ:
hinc prò varia illius regionis parte, prò variis quæ ex his dilabuntur
visceribus, diversis quoquē nominibus donantur herniæ. De singulis dif-
ferere vetant harum, penè dicam, infinitus numerus, temporis angus-
tiæ. Generaliùs tantum quædam proferam, circà modum quo terminari
solet bubonocèle, sive sit epiplocele vel enterocèle, aut entero-
epiplocele, & auxilia quibus possunt præcaveri; frequentiores enim
sunt hæ species.

EPIPLOCELE hernia omentalis, sibi quandoquē adscivit mala hæc;
accrescit, nisi reponatur, annullari foramini, parietibus sacci herniarii;
hæc dilatat; hinc, vel minimò risu, in entero-epiplocele mutandus,
multò certè periculosiorem. Omento his accretò, dejicitur quandoquē
ventriculus; hinc dolor sub digestionē, vomitus ferè continuus (a)
hoc intrà saccum compressò imminent inflammatio, suppuratio, gangræna.

ENTEROCELEM seu herniam intestinalem, gravissima minantur symp-
tomata; intestini agglutinatio & annulis abdominalibus & sacco; hinc
difficilis, imò & sæpè impossibilis repositio, major compressionis (*étran-
glement*) metus, quam pressò pede sequitur inflammatio, gangræna,
intestini ruptura, quam, decem tantum elapsis horis, cum morte acci-
disse observavit cum *Cajetano Taccono* (b), & *Meryo* (c) Egreg.
Antag. Sub inflammatione autem dolor vehemens, vomitus molestis-
simus, sæpius stercorosus, anxietates vix tolerandæ ægrum discruciant;
gangrænam verò prænuntiant frigus extremorum, facies hippocratica,
pulsus parvus, compressus cum sudoribus frigidis, doloris absentia,
lypothimiæ.

ENTERO-EPIPLOCELE hernia omento-intestinalis, minùs habet peri-

(a) *Ledran*, *Platner*, aliique, de epiplocele.

(b) *Recueil de Thèses*. Superstite ægro apud *Taconum*.

(c) *Collect. d'Haller*. tom. 5.

culi ; cave tamen ne comprimatur, vexetur, collidatur. Tumoris ab epiplocele pericula præcavebis, omenti in suo situ repositione, & aptæ quâ contineatur deligatione. Imminens tumoris inflammatio, aut, jam factâ inflammatione suppuratio, omni artis molimine avertenda est. Quæ si factæ fuerint, eâdem methodo his occurendum, quâ tumoribus phlegmonodeis. (*Vide infra*).

ENTEROCELES reductio, simulque methodica deligatio, sartum tectumq. servant ægrum à symptomatum jam memorata syndrome. Hôc autem inflammato, venæ sectionibus, repercutientibus, discutienda, si fieri possit, inflammatio, ut *taxi* restituatur prolapsa intestini pars. His incassum adhibitis, ad operationem tanquàm ad sacram anchoram confugiendum est; quâ ritè instituta, sedatis symptomatibus, in abdomen reducatur intestinum. Nec ab hac te deterreant gangrænæ metus, virium imbecillitas; namque & sub his circumstantiis faustum & nos illius operationis vidimus exitum, suadentibus Illustriss. D. D. de Lamure, & hujusce Civitatis Chirurgis præstantissimis (a).

Iisdem auxiliis entero-epiploceles occurendum est prò variis circumstantiis. Hermiarum sacci lacrymalis, ventriculi, vesicæ (b) incommoda præcavebis, aptis deligationibus.

Quæritur 2^o. Quinam sint tumorum qui à fluidis fiunt, termini, eorum signa, & auxilia.

Si ex calidorum genere sit tumor, resolutione, suppuratione & gangræna (c) terminari solet, vel induratione. Resolutione terminari phlegmonem judicabis, si mitescere incipiant symptomata, cum pruritus sensu decrescat tumor jam factus mollior. Solvitur enim tum verosimiliter impactus sanguis & viam circulationis sequitur, sive in extremis vasorum sanguiferorum hæreat, sive in vasa lymphatica, errore loci, deviaverit; qui finis, quia valdè est optandus, omni arte promoveri debet, venæ sectionibus, cautâ tamen manu institutis, topicis resolventibus, quæ, prò variis casibus, vel emollientia sint vel stimulantia. In his casibus mira præstat Extractum saturni D. D. Goulard.

Si his invitis exasperentur symptomata, de suppuratione esto sollicitus, quam levis præcedit horror, intensior febris, donec vi vitæ soluta vasculorum extrema, humore immeabili infarcta, in verum pus facecant. Tunc in acumen elevatur tumor, molliis fit, subalbidus, aut lividus; loco doloris pulsatilis, persentitur in parte gravitas. Hanc juvant medicamenta ex suppurantium familia, sub forma cataplasmatum aut emplastri, parti applicata, non prætermisiss auxiliis generalibus,

(a) Serres, Bourquenod, Mejan, & Vigariés qui operationem instituebat, maculas plures lividas, verè gangrænodeas, nobiscum observabant. Intrâ 10 dies convaleuit æger.

(b) Vid. act. Acad. Chir. Paris. passim.

(c) De his vid. tract. de tum. mox. cit.

nec intentatâ resolutione; pus factum illicò educendum, nè intrâ texturam cellularem sinus & fistulas cudat. Igitur exitus puri conciliandus, aut ferro, quod tutius est, aut causticis, factâ, in parte abcessûs decliviori, incisione. Singulis dein aut alternis diebus, detergendum vulnus, usquè dùm cicatrice æquabili, levi obducatur.

Si gravior urgeat inflammatio, cave à gangrænâ; quam, nisi omni artis molimine arceas, pressô pede sequitur sphacelus; calor mordax, & quasi deurens, intensus & obscurus tumoris rubor, febris vehemens cum aliis inflammationis signis, hanc prænuntiant. Tandem mollis fit tumor, sedantur symptomata; ast superveniunt syncopes, efflorescunt suprâ cutem maculæ lividæ, nigræ, in vesiculas ichore flavo ut plurimum turgidas elevatur epidermis, sola remanet in parte gravitas, nè ullô quidem sensu superstitè.

Gangræna generali præcavetur quandoquè inflammationis therapeiâ, antisepticorum usu. Si facta sit, ad vivum usquè, jubente *Celso*, incidenda est. Mira in hoc casu præstat cortex peruvianus, quod & propriâ experientia & nos comprobavimus, sive intus debitâ dosi adhibeatur, sive ejus decocto foveatur pars; non tamen omissis validioribus antisepticis, quibus cum successu maritari potest.

Resolutione sæpius terminatur erysipelas & desquamatione. Si suppuret in ulcus convertitur. Iisdem fermè mediis huic succurrendum est.

Induratio eadem habet signa, eadem auxilia ac schirrus qui inter tumores frigidos primas tenet cum œdemate. Hi autem varium obtinent terminum. 1o. Schirrus tumor glandulosus, durus, indolens, cuti concolor, in cancrum, horrendum quidè malum, quandoquè abit, ultimam post se trahit perniciem. Quamdiù tamen absquè dolore est, periculo vacat schirrus; aliquandò, sed rariùs, resolvitur. Topica ferè nunquam admittit, à stimulantibus, acerbis exasperatur. Plerumquè invitis his cautelis, nunc lentius, nunc velociùs intumescit, altas radices agens, maximè si peculiaris labes fluida infestet. Inflammatur cum sensu doloris nunc obscuri, mox deurentis; vasis varicosi tumet; eroditur tandem & sæpè cum hæmorrhagia, in ulcus convertitur fetidum, fænosum ichorem fundens; fit cancer difficilè topicis avertendus. Mira tamen in his sanandis præstare mercurium dulcem, ipsumque sublimatum, parcâ & cautissimâ manu exhibitum, Author est *Clessius* (a). De folano furioso stupenda refert *Alberti* (b) qui in cancro occulto, belladonæ foliorum decoctum, tanquam specificum commendat. Plures sanasse D.D. *Storck* Medicum viennensem legimus in diario Medico, (c) longò sed parciore usu extracti cicutæ majoris; plures aquis barregianis narrante (d) peritissimo D.D. *Bordeu*. Quantum autem in his casibus præf

(a) Thes. inaugur.

(b) Ibidem.

(c) Juin 1760.


(d) Ibidem Février 1760.

tent lacticia , balnea , cæteraque his analogæ auxilia , propriâ experientiâ comprobant , felicissimi practici (a). Hanc igitur suademus therapeiam , donec , iteratâ experientiâ , apud cordatos constiterit de specifici cujusdam efficacia.

ŒDEMA tumor lymphaticus mollis , digito cedens , lentiùs sese restituens , resolutione faciliùs , & frequentius terminatur , modò alterius morbi non sit soboles. Œdema resolvi cognosces tumoris imminutione cutis corrugatione , coloris naturalis restitutione. Promovetur topicis stimulantibus , maximè resolventibus , quæ vasa stimulant , tonum , elasticitatem restituunt.

Hæc prò aliis dicta sint tumoribus , nè in infinitum crescat hæc dissertatio. Ex his autem videtur posse explicari.

Modus quo terminari solent tumores tum à solidis tum à fluidis , afferre eorum terminationis signa diagnostica , prognostica ; simulquè auxilia , quibus illis occurrendum est prò vario modo quo terminantur.



QUÆSTIO QUARTA.

reparans

MEDICAMENTORUM facultates & agendi modum exponere.

MEDICAMENTUM id omne dicitur , quod intùs assumptum aut extùs applicatum , depravatas corporis dispositiones in melius mutat.

Sub evacuantium & alterantium genericâ & vulgatori divisione distinguenda veniunt medicamenta. Prò vario autem modo quo actionem suam exerunt , prima dicuntur , emetica purgantia , diuretica , &c. pro ut varias hæc , sub sensibili formâ evacuationes cient. Alterantium classim constituunt , tonica , laxantia , anodyna , adstringentia , aliaque hujus familiæ quæ apud materie medicæ Autores , ulteriùs divisa fusiùs recensentur. De his quæritur , quænam sunt illorum facultates ; quis agendi modus ?

Solam Medico sufficere medicaminum cognitionem historicam , quæ effectuum , sub diversis circumstantiis , constantiam , administrationis leges & regulas therapeuticas , sub variis morbi temporibus , prout hæc

(a.) Vide Ledran trait. d'opérations.

comprobavit fidelis & sæpius iterata, cum eodem successu, experientia; hanc inquam, empiricam therapeiam, sensuum testimoniò fultam, quam quotidie novis inventis illustrat, promovet observatio, certissimam, tutissimam, therapeiæ rationali ex omni parte anteponendam methodum volunt Hippocraticæ Medicinæ addicti Clinici. Effectuum rationem habere, abditarum rerum causas, medicaminum principia, vires, à priori detegere amant Methodici.

Ex hoc philosophandi studio, tot extant circa medicaminum vires theoriæ, quot Methodicorum sectæ. Medicamenta cum *Galeno* distinxit *Wedelius* (a) in calida, frigida, humida, sicca; & pro vario harumce qualitatum prædominio, varias quoque admittit in facultate proportionis, symmetrias seu gradus. Hæc autem primis qualitibus agere medicamenta dicebat. Extrinsecam medicaminum compagem, ex particularum & pororum dispositione cujus indices essent raritas, densitas, tenuitas, mollities, durities, &c. Ratione ponderis, contactûs, consistentiæ, ad qualitates secundas referebat. Colorem, saporem, odorem & nostris temporibus ad medicaminum facultates detegendas conferre, videtur subinnuere Cel. *Hoffmannus* (b). Qualitates tertii ordinis vocat *Wedelius*.

Qualitates autem medicaminum manifestæ vel occultæ erant, prout evidenti aut incognitâ actione vim suam exerebant; ista specifica divina vocavere.

Neotericorum plures ex figurâ, mole, duritie, asperitate particularum insensibilium & secundarum, medicaminum facultates enodare satagunt. Alii autem ex observatione effectuum, quos in sanguine vel è venis educto, vel intrâ vasa sua coercito, in animalibus viventibus præstant medicamina. Ne tamen his quæsieris quare hæc ita fiant.

Certior, simplicior nobis videtur empirica medicaminum pharmacologia. Hanc quotidie illustrat recentiorum Chemicorum indefessa sagacitas quæ methodo Bolducianâ (c) medicaminum compositionem rimatur; vel novâ, simpliciori, perfectiori methodo nuperrimè ab Illustrissimo *Venel* in actis Acad. Paris. consignata (d), quâ in evolvendis vegetabilium principiis, felici adeò cum successu usus est, Proff. ille Celeberr. Hæc medicaminum facultates, per eorum principia constitutiva cognoscere datum est, non ea quæ elementaria mixtorum rudimenta constituunt; nec enim ad Medici scopum quidquam præstare videtur, omne forsàn eludens ar-

(a) Lib. 10. sect. 1. cap. 1. de princ. agendi.

(b) Tom. 1. sect. 11. cap. 111. de medicam. viribus & causis.

(c) Mém. de l'Acad. 1734.

(d) Mém. de Physiq. & de Mathem. tom. 2.

tificium, talis disquisitio. His fortè subsidiis quandoquè licebit veras medicaminum facultates explicare.

Circà medicaminum agendi modum, ingeniosam, sanioris physices legibus congruam theoriam adornavit Illustriss. *De Sauvages*; quâ, iteratis experimentis comprobata singulorum viscerum gravitate specificâ, ex adhæſionis legibus statuit, medicamentum ideò in hoc præcipuè organon vim suam exerere, quod gravitatis specificæ familiaritate, magis huic sit affine; rem ferè acu tetigisse videtur in hâc subtili disquisitione, prælaudatus Autor.

Cuique visceri certum sensibilitatis & appetitûs gradum tribuunt experimenta, demonstrat observatio. Oleum oculo affusum, dolores acerrimos excitat; cantharides vias urinarias; aloëtica uterinas, &c. mercurialia ferè semper glandulas oris afficiunt; emetica vomitum cient, cathartica alvi fluxum; quid plura? Singula autem vel minimè cætera movent organa. An igitur hæc peculiaris organorum actio *archæi Helmontiani æmula* facultatem medicamenti specificatam arguit?

Defunt experimenta & observationes, quæ duo hæc pharmacologiæ empiricæ, qualem admittimus, puncta satis illustrent. Difficillimum ergò nobis videtur & penè dicam impossibile.

— *Explicare facultates medicaminum, eorumque agendi modum.*



QUÆSTIO QUINTA.

viginti duæ

QUIBUS morbis hætenus & quomodo opitulata sit electrificatio.

MISSIS electricitatis historiâ, phænomenis, legibus, quæ cognita supponit proposita quæstio, assignandi. 1°. Veniunt morbi quos hucusquè, historiæ fide, per electrificationem sanatos novimus. 2°. Modus quo opitulatur hæc operatio.

Electrificationem, morborum maximè qui in nervis insident, optimam, efficacissimam esse Medicinam, fidem faciunt observationes. Ex millenis enim, quos apud varios authores collegimus, penè dicam omnes, ad paralytodeos, ad spasmodicos, vel ad dolorificos referri posse videntur in morbi.

EX MORBIS PARALYTODEIS mira perhibet Illustriss. *De*

Sauvages (a) de hemiplegia per electrificationem curata. Quia autem experimenta hæc, sub oculis nostris quasi instituta sunt, mirantibus hujuscè urbis viris clarissimis, liceat prætermittere. Duas hemiplegias epilepticas, hemiplegiam à crapulâ, hemiplegias inveteratas, electrificatione sanatas legimus, apud Clariss. *Verratti* (b). Singularem pertinacem paralyfim, multo electrificationis molimine, tandem sanavit, Illustriss. *Jallabert* (c). Paralyfi, cum oculi sinistri occæcatione, & mutitate, electrificationibus finem fecit *Lindhult* (vid. diar. Stockolm ni fall); furditati (idem) amaurosi *Quelmatz* (d); mutitati, *De Sauvages* (e) loquendi difficultati (f); innumera alia quid referam, apud observatores fusiùs legenda.

EX MORBIS SPASMODICIS, contracturam, epilepsiam, post electrificationem evanida, legimus (g).

EX MORBIS DOLORIFICIS, quot sub primis electrificationibus solatium habuere & salutem, plures casus refert Illustr. Prof. (h). Cephalalgiam, articulorum, muscutorum dolores varios, [ibid.] odontalgias, otalgias (i), sæpiùs sanavit electricitas. Testiculi dolor, sub coelo humido recrudescens, à suppressâ gonorrhæâ, post electrificationem inopinatò evanuit [ibid.]; ex his videtur concludi posse, electrificationem, efficacissimam, adversùs nervorum morbos potissimùm, præbere Medicinam.

Nec tamen nos latet, & in aliis, [sic in morbis à cohibitâ perspiratione], fuisse utilissimam. Tumorem cum herpete sanatum, memorat *Verratti* [l. c.]. Capitis dolores ab epiphorâ [ibid.]; perniones (k). febrem quartanam, *Lindhult* [l. c.]. Ast quia in nervorum affectibus, magis constans observatur electrificationis efficacia, maximè si ab atoniâ, & humorum immeabilitate, pendeant; stat assertio.

Quoad secundum, modum scilicet, quo effectus suos fortitur electrificatio, sufficienter explicant 10. Enumeratio phœnomenum, quæ sub ipsâ operatione observantur. Calor enim in corpore augetur, intumescit electrificata pars, arteriæ pulsant vividius, frequentius [renuenti-

(a) Haller disp. morb. tom. 1. Thesis Monsp. propugn. 1749. In quâ electrificationis vires. variasque methodos, describit Prof. Illustriss. lett. à M. Bruhier, & Journal œconom. fev. 1752.

(b) Observ. Physi-medicales, sur l'Electricité.

(c) Expérience sur l'Electricité.

(d) Haller *ibid.*

(e) Journ. *ibid.*

(f) Mem. de l'Acad. de Stockolm 1753.

(g) Mem. de Stockolm, Journal œconom.


(h) *Ibid.* Pivatti, lett. sur l'Electri. veram arthritidem, sanavit.

(i) Mem. de Stockolm.

(k) *Ibid.* Et Jallabert, lib. cit. aliique.

tibus (a) D. D. Morand, Nollet), sudoribus diffluit corpus; solidæ corporis partes sensibilibus, quasi stimulo adacto, convelluntur. Hæc præcipua sunt. 2°. Morborum electrificatione sanatorum natura, atonia scilicet solidorum, lymphæ visciditas, inertia. 3°. Hujusce operationis, sub datis circumstantiis, effectus; verosimillimum videtur materiem electricam, quæ ex Physicis velocissima, volatilibus, penetrantissima observatur, in corpus admissam, arteriarum oscillationes adaugere, quibus lymphæ fit fluxilior; nervos stimulare, ac fluidi nervei vel electrici motum, re-feratis obstructionibus, restituere. Hanc rem confirmant, sub ipsâ observatione, operata phænomena. Medicamentosam facultatem fluido electrico, sub ipsâ operatione, dabat Clariss. Privati (b), cylindros, variis in-terius unguens medicaminibus. Sic cylindros catharticos, diureticos, &c. sibi comparaverat [Vid. loc. citat.] ex his habetur.

Quibus morbis hætenus, & quomodo opitulata sit electrificatio.



QUÆSTIO ~~SEXTA~~.

vijavoun

QUÆNAM sint in diversis morbis, diversæ corporis posituræ commoda, & præsentia inde eruenda?

A Naturali corporis consuetudine quandoquæ deflectere, bonum est. In diversis enim morbis, 1°. Summa sæpius ægris præstant com-moda, inassuetæ posituræ; 2°. Medicis quandoquæ exhibent certa præ-sentia. De his sigillatim.

Circà primum, pathologiæ methodicæ exactissimam morborum divisio-nem perlustrans, annotabo, quantum licebit, peculiare posituras variis morbis utiles. Igitur,

IN MORBIS SUPERFICIARIIS. Herniæ potissimum singulares, corpo-ris posituras amant. Supinum jacere flexis genibus ægrum, natibus paulò elatis, suadent Medico-Chirurgi ut, laxatis musculis abdominalibus, mi-nor parti elapsæ fiat resistentia. Ventriculi herniam, ad minimum mo-tum denuò erumpentem, habet Garengot (c); de intestinali-

(a) Mém. de l'Acad. 1749.

(b) Loc. cit.

(c) Mém. de l'Académie de Chirurgie, tom. 1,

bus (*a*), omentalibus, maximè si recens factæ sint, quantum profit decubitus horizontalis, nota rest est. In cystocele, sub variis circumstantiis, lumborum aut scroti elevationem suadet *Verdierus* (*b*), ut facilius urina ejiciatur. Tumor ab uteri, vaginæ procidentia (*c*), evanescit diuturno decubitu. Quid de fracturis, luxationibus, musculorum aut tendinum transversis vulneribus, quæ sola sanat, artificiosis membri flexuris, chirurgia? Anatomicis obvia est horumce phœnomenum ratio.

IN MORBIS INFLAMMATORIIS. Pleuritidis dolor acutus sedatur, aut saltem mitescit, varia corporis ad alterutrum latus positurâ. Inspiratio, solâ abdominalium musculorum, aut diaphragmatis actione, facta, aut elevatô solùm altero thoracis latere, dolorem mitigat. Ingravescente morbo, situs erectus, respiratio elevatô capite facta, miseris solatium præbet. Inflammatâ trachea arteria, sedens facilius respirat æger, *Ledram*. In faucium inflammationibus, miserè detorquetur caput, protenditur collum, prò variâ morbi sede, deglutitionis tempore. Undè in his posituris tot & tanta bona, docebit anatomia.

DE EXANTHEMATICIS, audias *Hoffmannum* (*d*) post diuturniorem erectum in lecto, vel extrâ lectum, situm, evanescunt cum delirio & convulsionibus exanthemata.

Ex SPASMODICIS, in epilepsiâ præstat potius situm erectum tenere (*d*).

IN MORBIS DISPNOICIS. Vix unquàm *incubus* accidit in latus decumbentibus, *Lommius*. Erectô corpore, rectâque cervice spiritum trahens asthmaticus, suffocationis avertit periculum. A sitû horizontali exacerbatur spiritûs difficultas, mitescit ab erecto, apud hydrothoracicos [Illustriss. Professor.] Empyicos, qui anxîâ corporis jactatione, solatium in variis posituris, vix reperiendum quærunt.

IN MORBIS SYNCOPALIBUS. Notum est efficacissimum in horizontali situ, adversus syncopes, lypothimias, haberi remedium.

IN MORBIS DOLORIFICIS. In colicâ, peculiaris est corporis in ventrem positura, extrâ quam dolor ingravescit. arthritici, rheumatici, multô molimine, in artuum comodo situ, solamen quærunt. Ex calculosis alii recti, alii supini vesicam deponunt; quidam inclinati, aut colem contrectando, malum leniunt, *Lommius*. Tandem in evacuatoriis morbis, quies primum medicamentum.

Ex his posituris, plures monstravit natura, cætera invenit ars. Surdos, ore

(*a*) Enterocелеm ad utrumque inguen decubitu aliquandiu protracto, & adstringentium usu externo, sanatum vidi apud Chirurg. alumnum.

(*b*) Mém. de l'Acad. tom. 2.

(*c*) Ibid. tom. 3.


(*d*) Hoffm. tom. 1. sect. 1. cap. 8.

(*e*) Ibid. de Epileps. tom. 3.

hiante, sonos excipere, natura; exesô epiglottidis altero latere, inclinato capite versûs latus oppositum, absque tussi deglutire quemdam docuit *Petitus*; palato fissô, clausis naribus, *Boerhavius*. Horum autem, aut saltem plurium, rationem præbet corporis anatomica cognitio, viscerum situs, motus, nexus, musculorum antagonismus.

Quoad secundum, dicimus, circâ variæ posituræ præfagia, vix quidquam omisisse *Hippocr.* in cuius verba jurasse numquàm pœniteat. Hæc autem habet in prognosticis passim. 1°. Is optimus censetur decubitus, qui bene valentium similis est. 2°. Vires penitus oppressas, vel jam exhaustas arguit prolapsus ad pedes, notantibus cum *Hippocr. Dureto, Klockof (a)*. 3°. Cerebri affecti signum est, ægrum provolvere se ad lecti margines, nunc surgere, nunc excidere; quod sub obscuro delirio ferè semper observabis. 4°. Ægrotum sedere velle, in acutis, pulmonum arguit angustias. Decubitus in unum latus impossibilis, empyemata, abscessum alterius arguit. Cujuscumque posituræ inconstantia, pulmonum infarctum, quandoquè mortem prænuntiat. 5°. Tandem in ventrem jacere, inassuetum partium hujus loci dolorem, aut delirium indicat. Sufficiat generalia attigisse præ temporis angustiiis. Sic enim, satis indicavimus.

Quanam sint in diversis morbis, diversæ corporis posituræ commoda, & præfagia, saltem generalia, inde eruenda.



QUÆSTIO SEPTIMA.

viz a v o u

EXACERBATIONUM, accessuumque febrilium theorias, saltem præcipuas, historiæ fide propositas, æquâ judicii clinici lance perpendendô, determinare quænam ex illis observationi magis minus-ve consona sit, & quænam magis vel minus utilis, aut noxia?

FEBRIS, quam in calore præternaturali, à bile & pituitâ incalescentibus, veteres cum Hipp. (*b*); in frequentia pulsûs cùm functionum læsione, quidam ex neotericis; in aucto virium vitalium gradu relativè

(a) Durer in coac. Klockof. opusc. med.

(b) De Febr. cap. 7.

ad musculares, alii, in intermittentem & continuam scinditur, quæ posterior suas quoque patitur exacerbationes. Mirum certè quot sibi finxerint theorias tùm veteres, tùm recentiores Medici, quibus exacerbationum, accessuumque febrilium regulares periodos explicarent.

Veteres febris continuæ fomitem in vasis majoribus, inter alas & inguina sitis, collocabant. Ast harum, quæ, pari semper impetû, cor exercent, materiem in venis cordi proximis; cæteræ verò quæ excandescunt in venis aliquantùm disjunctis, è quibus putredo in cor assiduò ferri nequit, habere arbitrabantur [*Fernelius*] (*a*). Hic autem februm intermittentium causam, circà præcordia adhærescere credidit, quæ prò vario putredinis aut mobilitatis gradu, diversis periodis excandesceret, usquè dùm id quod è foco excussum est, calore crematum, dissiparetur, aut in sudores abiret (*b*). Eadem ferè scribit post *Fernelium*, *Sennertus* (*c*) qui morbi fomitem in mearaicis; materiam in pituita, bile, melancholiâ; recursûs causam, in humoris naturâ & putredine quærebat, cœlestes tamen influentias penitùs non rejiciens.

Ex neotericis plures, materiam febrilem in cavitatibus & tubulis secretoriis primarum viarum, nidulari arbitrabantur, per vasa lactea, continuò aut periodicò fluxu, in sanguinis oceanum devehenda, quæ eadem labe humores inficiat, inspisset. Hinc in vasis capillaribus hærens, circulationi obicem ponit, hujus organa ad vividiores, frequentiores oscillationes stimulat; quibus, solutâ obstructione, penitùs remittit accessus, si ex intermittentium genere sit, exacerbatio tantùm, si ex continuis, remanente semper difficili per vasa capillaria transitu. Ex *Sennerti*, & *Fernelii* opinionibus, videtur extructa hæc theoria, quam tueri videtur *Hoffmannus* (*d*) qui materiem salino-sulphuream à præcordiis ad nervorum originem delatam vult, quæ spasmodicum systematis nervosi & vasculosi insultum ciet, evacuatione materiei febrilis sedandum, reversurum tamen à simili causa.

Cel. *Wanfwieten* (*e*) probabilius tantùm sibi videri statuit, februm intermittentium causam in subtilissimo fluido nerveo, vasis illud continentibus, aut *Encephalo* hære, quæ determinatò tempore, in actum deducatur; nec ad hoc necessarium esse fomitem in quo causa actuans colligatur, alternis aut singulis diebus exacerbationes aut accessus movens. Febrîs enim recursûs periodici causam, se penitùs ignorare fatetur cum *Sydenhamio* (*f*). Huic pariter suffragantur *Stahliani* qui febrem definiunt naturæ conamen, materiem morbificam, proportionatis secretionibus & excretionibus, removere satagentis; sic *Junc-*

(*a*) De Febr. cap. 11.(*b*) Fernel. cap. 9.(*c*) Lib. 22. de Febris cap. 17.(*d*) Thes. path. de feb. ter.(*e*) Comm. in Boerh. §. 757.(*f*) Sidh. cap. 5.

keras (a), de periodicæ intermissionis causâ non solliciti.

Hæ præcipuæ mihi videntur exacerbationum, accessuumque febrilium theoriæ, historiæ fide, consignatæ. Dùm autem æquâ ponderantur iudicii clinici lance, ita minùs observationi consonæ deprehenduntur, ut & noxiæ & inutiles confendæ sint. Fictitia enim ex omni parte videntur, quæ de morbi sede, de materiæ morbificæ motibus, hujus in sanguinem transitu, proferunt viri de cæterò præstantissimi. Quâ enim observatione hæc innititur theoria, Undenam hæc virtus inspissans? Quomodò renovari potest jam expulsa materies morbifica, ut novum insultum cieat? Latet-ne semper in primis viis morbi causa? In locis à primis viis disitis quandoquæ tragœdiam agit materies morbifica, sub primo morbi insultu; ante accessum, nè vel minima in primis viis sui præbet indicia febris: & quare vomitus, diarrhæas, materiæ febrilis aggestioni, aut in sanguinem transitui potius tribuas, quàm illius ex sanguine excretioni, quod magis videtur probabile?

Observationi, & naturæ magis congruere videtur hujus phœnomeni theoria, quam consignavit author anonymus, sed peritissimus, in eximio tract. *de recond. feb. intermitt. & remitt. naturâ*. Hæc enim scribit; diffundi per omnes corporis partes materiem in corpore genitam, aut aliundè advectam, hepatis potissimum infestam, quæ actuata quovis stimulo, illius visceris textum & nervos vellicare, & totum corpus commovere possit. Ut autem periodorum causam assignet, innumeris exemplis probat, varias animantium partes certis subjici legibus. Quilibet potest famem, somnum, excretionem certis circumscribere terminis; quare & materies febrilis in hepate collecta, certis temporibus strages suas non ederet?

Huic, quodam modo adstipulari videtur Illust. Auth. *novi Medic. conspect.* qui, veterum more, de summâ & exquisitâ partium epigastricarum sensibilitate, & earum in totum corpus influxû, mira certè profert, quibus apprimè dilucidatur, febrium exacerbantium & intermittentium theoria. Etenim dùm ex pravo rerum non naturalium usu, invertitur ventriculi tonus hujusque sensibilitas, gravantur & quasi infestantur nervi epigastrici; hinc functionum læsio, nervorum irritatio, virium corporis concentratio (b), aliaque febris phœnomena, cujus accessus rectè equidem non-nullis (c), digestionis opus mentiri visus est. Sic etiam insultuum periodos, quantum humanæ menti licet, assequi potest qui organorum sensibilitatem, mobilitatem ritè investigare potuit. Quis enim nescit statis temporibus, imò & horis, periodicas con-


(a) Tab. 56. de Febr. b.

(b) Thes. de Fibræ nat. virib. & morbis D. D. Fouquet.

(c) D. D. Bordeu, Thes. an omnes organicæ partes, &c.

tingere evacuationes, quem ritum servent menstrualis & hæmorrhoidal fluxus? (a) nonne eadem causa quæ rhumatismi, epilepsiæ, podagræ periodos disponit, dirigit, eadem febriles insultus alternare valet (b)? Ex his liceat.

Exacerbationum accessuumque in febribus theorias, saltem præcipuas, historia fide propositas, aquâ judicii clinici lance ponderando, determinare quam ex illis observationi magis vel minus consona sit, & quam magis minusve inutilis, aut noxia.



QUESTIO OCTAVA.

vijarou

AN Idiosyncrasia, consuetudinis desuetudinisque naturæ in functionum exercitio, singulare tandem appetitum, in morborum decursu, quandoquæ supervenientium, rationem habere sedulam, Medico per-quàm utile sit, imò & necessarium?

O MNIBUS agris eadem non conveniunt auxilia, ait Celsus (c). Aliâ methodo, diversis auxiliis, majoribus opus esse cautelis, præ variâ ægri idiosyncrasiâ, consuetudine, desuetudineque naturæ, in functionum exercitio & singulari appetitu, quotidiana docet observatio. Et quidem id. Utile est, imò & necessarium in præscribendâ diætâ, in administrandis auxiliis, quæ vel pharmacia suppeditat, aut chirurgia, solidorum & fluidorum statûs, sedulam habere rationem. Toto coelo distant in rustico & muliercula, in puero & in sene, corporis textura, sensibilitas; cuilibet ætati, temperamento singularis est pulsus; mobilissimum habet genus nerveum mulier hysterica, vir hypochondriacus; biliosis fervet quasi totum corpus; languent functiones apud phlegmaticos, quæ cum quâdam alacritate à sanguineis exercentur. Stricti autem & laxi à Methodicis proposita doctrina, à Clinicis probè intellecta; fluidorum spissitudo, dissolutio, acrimonia suis signis cognita, omnem adimplent paginam.

Quantum autem lucis in therapeia spargat, singularis cujusque idio-

(a) Bordeu, recher. anat. sur les glandes.

(b) Auth. anonym. de recond. febr. etc.

(c) Lib. 3. cap. 1.

Syncrasie cognitio, quis non videt? Hâc enim perspectâ, clariùs elucescit signorum doctrina, maximè verò auxiliorum selectus. Hînc facilè habemus quare apud sanguineos, biliosos, mira præstet venæ sectio, quæ histericis spasticas vasorum stricturas auget, malum irritat; quare cathartica ex drasticorum familiâ, rusticis quandoquè alvum vix moveant, dum ex mitioribus benignissima, mulierculas mirè perturbant; quare sua cuique debeat componi diætâ, his demulcens, aliis parùm tonica. Singulis enim sua sunt emetica, cathartica, cardiaca, aliaque auxilia; peculiaris in præparando, in exhibendo methodus; nunc cardiaca catharticis maritanda sunt, nunc cum narcoticis adhibenda. Quid plura proferam?

20. Consuetudo & desuetudo altera est natura. Cùm igitur ex *Hippocrate*, *Medicus naturæ minister sit*, varios illius motus, etsi primâ fronte inordinati, imò & noxii videantur, sollicitè perscrutari debet, ut fidam signorum doctrinam sibi comparare possit, & therapëiæ errores præcavere. Nullum, v. g. periculum intentant excretiones quædam, ut vomitus, diarrhææ, hæmorrhagiæ, si sint familiares & assuetæ. Hæc dicta sint de pluribus aliis.

Ast in prognosticis, summi quidem momenti est, consuetudinis desuetudinisque ratio. Et 10. Quidem in prædicendis ex pulsu crisis, illius naturales anomalie, notante D. D. *Bordeu*, præ oculis semper habendæ sunt; facilè enim Clinicum decipiet pulsûs intermittentiâ, si prò signo critico, aut prognostico, apud assuetos hunc habuerit. 20. Etsi ore hianti dormiat quidam, non commissis palpebris, cum stertore spiritum ducat, respiratio difficilis sit, singultus observetur, malè decumbat, si hæc ex consuetudine fiant, mali non sunt ominis.

In præscribendâ diætâ de his maximè sis sollicitus. Voraces enim tibi nutriendi magis sunt; delicatuli, parciori cibo assuefacti, minùs: & inter hos, quidam acida appetunt, alios aquosi potus delectant. Imò ex *Hipp.* (a) *Prava victûs ratio, modò assueta, plus confert, quàm melior & inassueta.* Rem illustrare videtur historia singularis à celeb. D. D. *Bordeu* relata (b) Pueri qui, rusticorum more, enutritus, optimâ fruebatur valetudine; ast inter epulas, vix annò elapso, occubuit scropholosus. Vino dediti, liquoribus ardentibus assuefacti, exsolutis viribus, collabascunt, si solus aquæ potus his concedatur; vini pauxillum finas, illicò refocillantur. Ebrioso phrenitico vini usum interdicebat Medicus, ingravescebat phrenitis, quæ iterùm mitior fiebat, restitutô hujus liquoris, etsi dilutissimi, usu. Idem post assumptam potionem cathartico-emeticam, vinum è dolio liberaliùs hausit, absquè sensibili phrenitidis incremento.

(a) De rat. vict. in acut. sect. iv.

(b) Prix de l'Academ. de Chir. vol. 3. ou Dissert. sur les écrouelles.

Quoad medicaminum administrationem ; hæc omnibus nota sunt , assueta parùm proficere. De opio præsertim istud verum est. Quis nescit vini generosi , coffeæ potum , leves stomachi affectus fugare ; assuetis inutilem esse Medicinam ? uno verbo , vim naturæ intuleris , si à consuetis removeas , vel ad inassueta compellas.

30. Quoad appetitum , responsum præbet Hipp. (a) *Cibus & potus paulò pejor , suavior tamen , melioribus quidem , sed minùs gratis anteponendus.* Neminem enim latet quàm sæpiùs , post diuturnam diætam , profuerit , à tenui victûs ratione recedere , naturâ absurda suadente , modò , propriâ substantiâ , non sint noxia , aut naturæ morbi directè opposita. Absurdò enim appetitu , ventriculi atoniam avertere , quandoquè studet propria hujus sensibilitas. (b) Hoc fine , carbonum , cretæ , terreorum desiderium apud chloroticas excitat. Nec certè in his errat natura , sed Medicus qui naturæ fines non assequitur. Hâc igitur regulâ hippocraticâ edocti , utile & necessarium credimus , quandoquè ægris minùs salubria concedere quæ avidè appetunt. Ex his concludere pronum est.

Idiosyncrasia , consuetudinis desuetudinisque naturæ in functionum exercitio , singularium tandem appetituum , in morborum decursu , quandoquè supervenientium , rationem habere sedulam , Medico per-quàm utile esse , imò & necessarium.



QUÆSTIO ~~NONA.~~

Quæstio

AN nova pulsuum methodus SOLANIANA , ulterioribus detectis amplificata , adeò magna prò praxi medicâ promittat , & quidem eâ saltem probabilitate , ut ingenuo Medico non liceat hanc intentatam prætermittere ?

DUO proponuntur in hacce quæstione , solvenda problemata. 1^o. An magna realiter , prò praxi medicâ , promittat nova pulsuum methodus , præscindendo à promissi veracitate. ? 2^o. An magnum quid & utile reverà præstet hæc methodus , & quònam certitudinis gradu , eius promissis confidere liceat ?

(a) Aph. 38. sect. 1.

(b) Thes. aliquot. de sensib. & contract. part. D. D. Francisci Bordeu.

Bina hæcce problemata aggressurus, pulsum naturam & differentias tum in statu sano, pro variis ætatis, sexûs, temperamenti, conditionibus, tum in statu morbofo, quoad illorum ordinem, rithmum, species, ex *Galen*i mente, aut novâ pulsum methodo delineare, neutiquâm fuscipiam. Disquisitionem historicam circâ morem judicium statuendi therapeuticum ex pulsûs exploratione, lubens etiâ silentio premam: hæc tantum breviter narrans, hanc *Hippocrati* (a) fuisse notam, sed ad *Galen*i (b) usquè tempora, minus fuisse adhibitam, etsi jam in ordinem digessisset, & quidem in his nimius, *Herophilus*, notante *Plinio* (c), & plura habuisset *Celsus* (d), sed ut de methodo minus fidâ & parum usitatâ; posterioribus tamen sæculis pulsûs explorationem factam fuisse Medicis verum morborum lapidem lydium; circâ hanc methodum mira perhiberi de finensium peritiâ (e); & tandem hoc nostro sæculo, prima novæ doctrinæ fundamenta jecisse *Solano* (f); quamplurimis ditasse observationibus, clar. *Nihell.* (g); Gallicè promulgasse & illustrasse hu, usce Universitatis Doct. Cl. *Lavirotte* (h); ex gallico latinè reddidisse *Willelmum Noorthwick* (i); solanianam methodum in alium digessisse ordinem, amplificasse, novis inventis adornasse, innumeris firmasse observationibus, verbo, ex hac novam artem condidisse *Celeb. D. D. de Bordeu* (k); Ex hoc, *Solano-Bordevianam* methodum novas vires in dies acquirere; hujus veritatem paucis ab hinc comprobasse & suis locupletasse observationibus Doctorem nostrum *D. D. Michel* (l), & novissimè parisi. Medicum *D. D. Le Camus*, (m).

Hæc autem sic prælibasse sit satis, nè vanum & inutile præloquium sapiat prolixior disquisitio. Authores nominasse suffecerit, exscripsisse tædiosum & inutile.

Ut igitur propositæ quæstioni directè respondeam, quoad primum problema, animadvertendum est, quod, etsi Clinici unâ voce conclament pulsum sibi esse veram praxeos cynosuram, attamen quàm parum lucis spargat vetus pulsum theoria, quàm parum cauta, quàm infida in certis quibusdam, sed gravissimis quidem circumstantiis, fateantur, ne-

(a) Sect. 4. lib. de alim. coac. præn. 138. & sect. 7. epidem. lib. 2.

(b) De puls. gener. & differ.

(c) Lib. 29. cap. 1.

(d) Lib. 3. cap. 6.

(e) Barchus. de Med. orig. & præg.

(f) Lib. cui tit. lap. lyd. apolli

(g) Nov. obs. circâ cris. præd.

(h) Obs. nouv. & extr. sur la pred. des Crises.

(i) Novæ observ.

(k) Recherches sur le pouls.

(l) Nouvell. observ. sur le pouls.

(m) Mém. sur divers sujets de Médecine.

cesse sit : Namquæ , v. g. , præ omnibus sit sequens animadversio. Pulsus celer, frequens, magnus, per solas hæc qualitates consideratus, & nullâ habitâ ratione ad characterem suum vel acriticum, vel criticum, febris intensissimæ signum habetur, omni artis molimine sedandæ; at, sub certo morbi stadio, salutare naturæ molimen arguit, non refrænandum, nisi cum malis ægri rebus.

Sed missâ omni censurâ, quam acriter satis persequuntur Clar. Fr. Hoffman (a) & de Bordeu (b), si æquâ lance librentur veteris doctrinæ emolumenta, cum iis quæ praxi Medicæ promittit Bordevianum potissimum dogma, hæc ultima adeo cæteris præstant, ut huic solum assensum denegare audeat invidia novis semper infensissima, etsi momentosis, inventionibus.

Stupenda enim praxi clinicæ spondet Bordeviana methodus, quibus ab Michel (c) & Le Camus (d) recensitis addimus, morborum tempora, ex vulgatâ divisione, in initium, statum, & declinationem, sive per dierum numeros æstimata, nullô certo ordine circumscripta, infidis manifestata signis, evidentissimis ex novo criterio, certissimis concludi cancellis (e), & cum illo morbos qui sub convalescentiæ cujusdam speciè larvati inducias simulant, non ita sæpè Medicum delusuros.

Cui igitur ingenuo Medico liceat hanc intentatam prætermittere methodum, quæ tot & tanta arti clinicæ spondet? non huic certè quibus artis progressus & perfectio cordi est, nisi severissimis demonstrationis legibus tanti promissi vanitas, impossibilitas, aut tentandi periculum comprobata fuerint. Nec dicatur hanc pulluum methodum pluribus ab hinc annis promulgatam, à paucissimis adhuc admitti. Quem enim latet circulationem sanguinis, infensissimam habuisse per-celebrem Medicorum scholam; hanc eandem, chymiam diù despexisse; emetica antimonialia, quibus efficaciora nulla habemus medicamenta, infamasse?

Nos igitur majorum erroribus edocti, dicimus, 1°. Novam hanc doctrinam, dum observationibus suffulta prodit, nullo unquam evertendam ratiocinio, minùs adhuc scurrilibus jocis, sed observationibus tantum verè contradictoriis. 2°. Nullas esse indicatas difficultates; nec necessariò nobis denegatam credimus finensium sagacitatem, de quâ stupenda perhiberi non

(a) Med. rat. tom. 3. sect. 1, cap. 12. de ration. puls. explic. §. 1. 4.

(b) Recherch. sur le pouls, pref. & chap. 2.

(c) Voy. la pref. pag. 6 & 7.

(d) Mem. sur le pouls. Avec une telle doctrine, le pronostic dans les maladies doit être plus certain, le traitement plus éclairé & plus sûr, le tems pour placer les remèdes plus déterminé, la qualité des médicamens à employer plus décidée, la route que choisit la nature pour se débarrasser plus connue.

(e) Tempus irritationis, coctionis, solutionis probè intellectum, magnam afferre in praxi utilitatem.

ignoramus, cum potius hæc ipsa animum irritent; si que vana, talia tentando, commenta infectati fuerimus, non ideò inutilia hæc tentamina censemus; Sub his enim amplificatur habitus artificis, illique pulcherrima laus quod eximia sui sæculi detecta, omni ope annixus sit propriâ experientiâ comprobare; nec ideò damnandam credas, quod medicaminum administrationem plerumquè inhibeat; nefariam enim esse in plurimis casibus festinationem, nemo nescit. Exercitatissimis enim practicis, artis principibus solis licet hæc intentata prætermittere, qui longô usu, felici experientiâ edocti, singularem sibimetipsis, ex veterum doctrinâ, comparare pulsuum theoriam.

Igitur, quoad præsens solvendum problema, non proprium nostrum iudicium, sed demonstrationem logicam proponentes, concludimus cum Cel. *Van-swieten*, (a) meretur rei dignitas, ut ab omnibus qui *Medicina operam dant* exploretur.

Quoad secundum, an scilicet magnum quid & utile reverà præstet hæc methodus, quod propriæ experientiæ assensum supponit, dicimus cum hac tamen, qualem nos decet, modestiâ, 1^o. Illam quam primâ fronte præ se fert difficultatem, inexpertos solùm deterrere. 2^o. Hujus veritatem, innumeris comprobata esse observationibus felicissimorum practitorum. Pulsus intermittentem, diarrhæam prænuntiare observabat hujusce lycæi Prof. (b) & ut alios prætermittam, brevitati consulens, promissi veritatem spondet juniorum artificum sedula & fausta observatio, ad quos novæ cujuscunque doctrinæ pertinet iudicium, ex recentioris philosophi animadversione, inter quos hujusce Universitatis Doctorem egreg. (c) laudare decet, multos que non ultimæ notæ Medicinæ alumnos, qui & ipsi, viam monstrante Doctore mox citatô, sæpius in Nozocomio Monspeliensi experti sunt. Et quia apud Urbaniss. Antag. & propriis observationibus locus, me pluries cum jam laud. Doctore, hujus methodi utilitatem comprobasse dicam. Non aliundè habeo quod fidem denegem Illustriss. *Solano*, *Nihell*, *Borden*, *Michel*, *Le Camus*, qui ex professô de hujus methodi stupendâ felicitate scripsere; & plenô assensu admittendum censeo, Illustriss. Archiatrorum Comitibus (d) verè decretorium iudicium.

Cum igitur momentosa hæc argumenta, observationibus solùm ex professô institutis, dirimi possint, cumque vana & illegitima sint, quæ adversus hanc methodum hucusquè prolata fuere, non certè temerariè

(a) Comm. in Boerv. aph. tom. 2. §.

(b) Vid. Semeios. manusc. D. D. de Lamure.

(c) D. D. Fouquet, cum quo apud ægros charitatis, solâ pulsus exploratione mira equidem, circa diversos morborum eventus, definiri posse comprobavimus.

(d) Borden pref.

ausu , tyronibus spondeo, hâc novâ pulsuum methodo artem illustrari, amplificari, in immensum ditari. Hinc affirmativè concluditur

Novam pulsuum methodum SOLANIANAM, ulterioribus detectis amplificatam, adeò magna prò praxi Medicâ promittere, & eâ quidem probabilitate, ut ingenuo Medico non liceat hanc intentatam prætermittere.



QUÆSTIO DECIMA

AN inter Medicinas leviorum valetudinum benignissimas, acutorum maximè heroicas simulque tutissimas, constituendus sit tartarus emeticus?

DELETERIAM vim antimonio inesse, crediderunt majores nostri, & tanquàm toxicum machinæ humanæ insensissimum proscripserunt, nescio quò fatô. Inter auxilia enim pharmaceutica, contradicente ferè nemine, benignissimum, præstantissimum, tutissimum est medicamentum, tartarus emeticus, variis sexûs, ætatis, temperamenti conditionibus accommodatissimum, adversùs morbos acutos maximè efficacissimum, à catharticiis nunquàm supplendum. Sed hujus medicaminis utilitatem, præstantiam olim celebravit, post *Paracelsum*, *Mathiolum*, *Angelus Sala* (a), qui de vitro antimonii stupenda narrat. Igitur ad propositam quæstionem specialius accedentes, dicimus, 10. Inter medicinas leviorum valetudinum benignissimas, sed simul efficacissimas, constituendum esse tartarum emeticum. Hujus assertionis veritatem illustrat sequens animadversio. Ex iis qui tartaro emetico magis sunt insensi, omnes quidem, ne uno exceptô, fatentur benignissimam, tutissimam esse emesim ab oleosis, aquæ tepidæ potu, à faucium titillatione, imò qui in leviori valetudine operosis conaminibus hanc non promoveat, solo tartari emetici nomine perterriti. Hæc observant quotidie Practici. Quis tamen diversam dixerit vomitûs actionem, sive sit ab aquâ, sive à tartaro emetico? Nonnè iisdem potentiis utrumque natura molitur? An noxium ideò quis credat, quod in ventriculi tunicas actionem suam exerat?

Linguae tamen applicatus, licet exquisitissimo sensu præditæ, nullum irritationis sensum imprimit; & insuper, sedatô vomitu quem ciet, nullus doloris aut molestiæ sensus remanet; placidus enim somnus spontè obrepit,

(a) Part. 2. Anat. anim. sect. 2. cap. 1. & emetol. cap. 1.

totum corpus levius, alacrius fit. Benignissimam igitur præstat medicinam tartarus emeticus, simplici, levi, insensibili titillatione vomitum promovet, nulla suæ actionis vestigia relinquens. Hinc adversus leviores valetudines, coctionem læsam à nimia ciborum ingurgitatione, febres à crapulâ, inappetentiam, similesque hujusmodi affectus, vulgò *indispositions, indigestions*, quasi specificum habetur; hos enim in ipsis quasi incunabulis præfocat.


Dicimus 2o. Tartarum emeticum inter heroïcas acutorum medicinas esse constituendum; Sive enim in ventriculo, aut in locis summè disitis adhæreat morbi causa, energiam emesis non effugiet. Sub ipsâ enim emetici actione, levi stimulo sollicitatus ventriculus, collectis quasi viribus, noxios humores ejicit, viscera vicina commover; hinc stupenda sympathiâ, totum corpus succutit, obstructions, spasmos solvit; in morbis soporosis, sensus stimulat; in exanthematicis eruptionem promovet; in inflammationibus pectoris symptomaticis, restituit liberam humorum circulationem, sputum sanguinis supprimit; in febribus putridis, malignis, verminosis, quasi specificum videtur auxilium. Quid plura referam? Simul ac tragoediam peregit, evanescunt pleraque symptomata, aut saltèm mitescunt; natura à materie morbificâ prius obruta, nunc vegeta magis, ad opus se accingit, critica molimina ipsamque crisin disponit, dirigit, præparat.

Dicimus 3o. Tartarum emeticum tutissimam esse in acutis Medicinam, Sub diverso cœlo, variis anni temporibus, cuilibet ætati, sexui, temperamento accommodatissimum præbet auxilium; modò cauta & perita manus subministraverit; delicatulis enim, pueris, infantibus, imò & ipsis lactantibus, absquè periculo exhibetur. Et quidem prægnantes, annotante *Ang. Sala (a)*, non usquè adeò validæ, assumptum cibum quotidie evomunt, nil quidquàm detrimenti, aut corporis, aut foetus, imò multum potius emolumenti, ad facilem & salubriorem partum, ex hoc sentiunt. Sed cum quæstio potissimùm instituatur de acutis, & in his tutissimum esse dicimus; namquè ea solùm in his morbis præstant auxilia quæ naturæ motus dirigunt, stimulant, frænant. Ast nullum in his præstandis efficacius habemus tartarò emetico; nullam enim intentat perniciem, cum potius amica naturæ sint hæc conamina, quæ sub ipso vomitu, machinam quasi subvertunt. Sic organa sua sollicitat, ad molimina critica disponit, cricum vias expedit, materiei morbificæ coctionem, solutionem properat; quæ commoda, de aliis auxiliis, sub acutorum initio, vulgò adhibitis, expectari non debent. sæpius enim naturæ ordinem invertunt, illius salutares conatus infringunt; hinc quot

(a) Emetolog. cap. 1.

anomalix, ex intempestiva medicaminum exhibitione, oriuntur. Ex his concludimus,

Inter Medicinas leviorum valetudinum benignissimas, acutorum maximè heroicæ, simulque tutissimas, constituendum esse tartarum emeticum.



QUÆSTIO UNDECIMA.

An februm putridarum causa materialis, omnis in primâ corporis regione sedeat? An etiam partim in circulationis alveo? An adversus hanc posteriorem (si modo reipsâ detur) valeant cathartica?

FEBRIS putrida, *synochus putris*, est febrîs species, quæ ad secundam tertiamvè hebdomadam excurrit, cum summo symptomatum apparatu qui succorum pravæ indolis turgescientiam, in primâ corporis regione, arguit, & variâ virium tum vitalium, tum muscularium læsione. Circâ febrîs hujusce causam materialem, quæritur, 1°. An in primâ corporis regione sedeat? An partim in sanguinis alveo? 2°. An adversus hanc posteriorem valeant cathartica?

Quoad primum, febrîs putridæ causam materialem in primis viis potissimum hæere, unô ore conclamant practici; nec aliud suadere videntur symptomata quæ hunc morbum prænuntiant, vel ea quæ cum primo morbi insultu ingruunt, aut sub morbi solutione observantur. Neutra enim corporis prætergreditur constitutio [ait *Fernelius*], (a) excrementa præter consuetudinem succrescunt, appetitus languet, gravatur totum corpus. Ast præprimis talem materiei putridæ, in primis viis turgescientiam arguunt; oris foetor mephiticus, crûsta glutinosa, flava aut nigra, os internum, linguam, dentes obducens; nausæ, vomitus, diarrhææ potissimum quæ cum morbo ingruunt, aut criticè morbum sæpiùs solvunt.

Verùm non ità evidentibus signis dignoscitur, an simili labe inficiantur humores in sanguinis alveo. Febrem putridam ab evacuationibus suppressis, hæmorrhoidali aut menstruo sanguinis fluxu, v. g. aut à cohibitâ perspiratione, pendere à peculiari, sed vix determinandâ, humo-

rum labe, probabile est. Simile quid in aliis febrium speciebus, videntur arguere quædam febris putridæ symptomata; corporis scilicet gravitas, artuum dolores, variarum partium inflammatio, crustæ quæ labia quandoquæ infestant, sudoris aut perspirationis graveolentia; imò, quod certius indicium est, sudores critici quibus aliquandò solvitur morbus. Ast quomodò, & quò vitio inquinetur sanguis in hisce febribus? An pravi succi in primis viis stabulantes, in sanguinis oceanum, per vasa lactea, devehuntur cum chilò quem inspissant? Ast si hæc ità sint, quomodò chylus jam inspissatus, lacteorum orificia subire poterit? Et quare in sanguinem semel admissus, totam humorum molem eadem labe non inficit, sed ad certa quasi loca specialius deflectit, viscera potissimum infestare amet? Undenam subitæ illæ anomalix in decursu febris putridæ supervenientes? Quare, præcipiti quasi lapsu, à capite in pectus ruit, periculosâ quandoquæ metastasi, materies febrilis? Pollet nè virtute inspissandi specificatâ. Hæc & alia quæ fusiùs persequitur Illust. Auth. anonymus (a), rem saltèm dubiam reddunt.

Quidquid de illis sit, hoc videtur probatum, causam materiale[m] omnem febrium putridarum, partim in primâ corporis regione, partim in sanguinis alveo sedere.

Quoad secundum, dicimus cathartica, tempore opportuno exhibita, valere adversus febrem putridam, cujus causa materialis partim in sanguinis alveo latitat. Ex phœnomenis enim, quæ sub ipsâ cathartici actione observantur, manifestum est, medicamenta hæc effectus suos in sanguinem exerere. Equidem pulsus frequentior fit, major diffunditur per corpus calor; irritatâ enim tubâ intestinali, succutitur etiam tota machina, vasa vividius oscillant, major sanguinis copia ad secretoria illius loci vasa appellit, major fit excretio, brevi sudores erumpunt. Hæc autem omnia sanguinis depurationi favent. An ideò cathartica, in sanguinis oceanum delabi credenda sunt? An ideò lac nutricum virtute catharticâ pollet, quod hujusmodi medicamenti particulis priùs intrò assumpti fuit imprægnatum? Desunt, quod credo, argumenta quæ omne dubium circa hæc problemata tollant. Quidquid tamen de illis sit, certum est ex jam dictis, cathartica in sanguinem effectus suos exerere. Undè videtur posse concludi,

- *Febrium putridarum causam materiale[m] omnem, in primâ corporis regione non sedere, sed partim in circulationis alveo; Et adversus hanc posteriorem (quæ reipsâ datur) valere cathartica.*

(a) Idée de l'Homme physique & moral.

QUÆSTIO DUODECIMA.

2210/ a 1001

An in paralyſi & gangræna inferiorum, spinæ dorsi vulneris vexationiſvè conſectariis, abſquè luxatione in parte vertebrarum læſarum aut offis ſacri poſtica, Chirurgia quædam cranii terebrationi analoga tentari poſſit, nec-nè? & poſito quod affirmativè concludatur, quâ ratione inſtitui debeat exponere.

INTRA canalem vertebrarum offeum protenditur cerebri medullium, communibus cranii membranis obvolutum, ſub nomine ſpinalis medullæ; ex hâc oriuntur potiffimùm nervi extremis artubus proſpicientes, brachiales ſcilicèt, crurales & iſchiatici.

Læsâ aut vexatâ quôcumque modo medulla ſpinali, ſivè à fractis vertebris aut validâ commotione, illicò ceſſat motus & ſenſus partium vulneri inferiorum, fit paralyſis quam, preſſo pede, ſequitur atrophia, quandoquè gangræna.

Non deſunt exempla ſtuporis & paryliſis, à vexatâ aut collisâ ſpinali medullâ; gangrænam ſupervenire rarò obſervatur. Hanc tamen inter huiusce affectûs ſymptomata annumerant celeb. *Platnerus* (a) *Heiſterus* (b) *Peritus* (c); ſemel atque iterùm hanc obſervabit *Clr. Van-Swieten* (d): vir ſexagenarius lapſû ſpinam dorsi in acuto lapidis angulo ſic impinxit, ut ipſo momento, corporis pars inferior careret ſenſû & motû; ſextâ die gangræna plantam pedis utramque occupabat; ſeptima die periit. Similem caſum in juvene obſervabat.

Mortem inſtantem prænuntiant hæc ſymptomata; ſervari non poſſunt, ait *Ceſus*, quibus percuſſa eſt medulla; miſeris enim neque natura, neque ars unquàm profuit. Numquid ergò tentari poteſt operatio quædam, terebrationi cranii analoga? Toties fauſtum habuit hæc operatio exitum, quoties offis fragmenta cerebrum lædentia auferre, ſanguini

(a) Inſtit. Chir. rat. §. 186 & 355.

(b) Chir. part. 1. lib. 1. cap. 1.

(c) Maladie des os, tom. 1. chap. 4.

(d) Tom. 1. de Vulner. in gen. §. 162.

aut puri effuso exitum conciliare datum est. Quare in spinâ dorsi, imminente, ab iisdem causis, inevitabilis fati periculo, non liceret hanc artem experiri? Videtur huic sub-innuere *Ambr. Paræus* (a), dùm ait, vexatâ spinâ, fragmenta vertebrarum audacter, incisâ cutè, eximantur, aut reponantur. Eadem suadet *Heisterus* (b).

Verùm si nulla sit fractura saltèm sensibilis, inferiorum tamen paralysis & gangræna, medullæ compressionem arguant, quid præstabit ars? Liceat mihi novam & rudem, ast forsàn non inutilem proponere operationem, trepano analogam, ab artis magistris emendandam, absolvendam, in tantis vitæ angustiiis absquè periculo tentandam; scilicet, incisâ cutè, denudatis vertebris, derasô periosteo, in utroque spinæ latere ad radicem tuberculorum cautissimâ manu fecentur, ope ferræ, (apud *Scultetum*, tab. vi. n. i. delineatæ) vertebræ, ad canalis usquè interiora, cum hâc tamen cautelâ ut còleviùs moveatur ferra, quò altius penetraverit. his peractis, ablatô osse, cruciformi incisione aperientur medullæ involucra, ut sanguis, si effusus sit, abstergi, & ossis fragmenta eximi queant; Hæc autem aliaque, necessariò hîc prætermittenda, iisdem cautelis absolvet quæ in terebratione cranii præscribuntur. De his vid. *Ledran* (c).

Nec periculosissimam, operosissimam, impossibilem hanc operationem dixeris; artis enim magistris omni difficultate major industria. De cæterò nihil inevitabili morte operosius. Anceps igitur melius est quàm nullum experiri remedium. Magis fortè quibusdàm arrideat, si sectis, forcipum ope, spinæ tuberculis, terebratio qualis in cranio institutaur. Ex his concludere liceat,

In paralysis & gangranâ inferiorum, spinæ dorsi vulneris vexationisve consecutariis, absquè luxatione in parte vertebrarum aut ossis sacri posticâ, chirurgiam, cranii terebrationi analogam, methodo jàm propositâ tentari posse.

(a) Des fract. liv. 15. ch. 13.

(b) Ibid. Part. 2. lib. 2. cap. 7.

(c) Trait. d'oper.

ERRATA.

- Pag. 3. lin. 14. *Monroo*, leg. *Winslowius*.
 Ibidem. lin; ult. *anatomes*, leg. *anatome*.
 Eâdem lin. *etsi*, leg. *et si*.
 Pag. 5, lin. 31. *quæ* leg. *quos*.
 Pag. 11. lin. 8. *syptomatum*, leg. *symptomatum*.
 Ibid. lin. 18. *hermiarum*, leg. *herniarum*.
 Pag. 12. lin. 5. *levi*, leg. *lævi*.
 Pag. 17. lin. 9 & 10. *observatione, operata*, leg. *operatione, observata*.
 Pag. 18. lin. 2. *nota rest.* leg. *nota res*,
 Pag. 19. lin. 17. *ventrem, inassuetum*, leg. *ventrem inassuetum*,
 Ibid. ad not. (b) *Hippocr.* leg. *Ferncl.* de *Febrib.* cap. 7.
 Pag. 20. lin. 9. *habere*, leg. *hærere*.
 Pag. 23. lin. 33. *scropholosus* leg. *scrophulosus*.